

# OZIBEN®

Mebendazole

## COMPOSITION

- **Oziben® 100 mg - comprimés :**  
mébendazole : 100 mg pour un comprimé
- **Oziben® 500 mg - comprimé :**  
mébendazole : 500 mg pour un comprimé
- **Oziben® 200 mg - sachet :**  
mébendazole : 200 mg pour un sachet
- **Oziben® 30 ml - suspension buvable :**  
mébendazole : 100 mg pour une cuillerée à café de suspension (5 ml).  
Agents conservateurs : methylparaben 0,2%, propylparaben 0,02%

## FORMES ET PRÉSENTATIONS

- **Oziben® 100 mg - comprimés :**  
boîte de 6 comprimés
- **Oziben® 500 mg - comprimé :**  
boîte de 1 comprimé
- **Oziben® 200 mg - sachet :**  
boîte de 3 sachets
- **Oziben® 30 ml - suspension buvable :**  
flacon de 30 ml contenant 600 mg de mebendazole, avec gobelet doseur gradué.

## CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

Antiparasitaire / anthelminthique

## INDICATIONS

Oziben® est un médicament contre les vers parasites. Il est indiqué dans le traitement des infestations par une ou plusieurs des espèces suivantes :

- oxyures (*Enterobius vermicularis*),
- trichocéphales (*Trichuris trichiura*),
- ascaris (*Ascaris lumbricoides*),
- ankylostome (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*)
- anguillules (*Strongyloides stercoralis*),
- tenia (*Taenia* spp.).

## MISE EN GARDE

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

Ne pas utiliser Oziben® en cas d'hypersensibilité (allergie) au Mebendazole et, pour la suspension buvable, aux parabens (agents conservateurs).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament avec précaution chez les enfants de moins de 2 ans : Oziben® ne peut-être donné aux enfants de moins de 2 ans que sur prescription médicale.  
En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Informez votre médecin en cas de prise de cimétidine (médicament contre l'acidité de l'estomac), celui-ci pourra être amené à adapter la posologie.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

## GROSSESSE - ALLAITEMENT

En cas de grossesse, informez votre médecin qui décidera si vous pouvez prendre Oziben®.

En cas d'allaitement, consultez d'abord votre médecin qui décidera si vous pouvez prendre Oziben®.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis à votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

## POSOLOGIE

Le mebendazole étant très peu absorbé dans l'intestin, la posologie sera la même chez les adultes et les enfants de plus de 2 ans.

La posologie est variable selon les espèces responsables de l'infestation.

- **Oziben® 100 mg - comprimés :**

**Oxyurose :**

1 comprimé matin et soir, à renouveler 2 à 4 semaines plus tard. Le premier traitement tue les vers, mais pas les oeufs, ces oeufs pouvant causer une nouvelle infestation, le deuxième traitement est nécessaire pour éliminer complètement l'infestation.

**Ascariidose, trichocéphalose, ankylostomose, infections mixtes :**

1 comprimé matin et soir pendant 3 jours.

**Téniase et anguillulose :**

1 comprimé matin et soir pendant 6 jours.

- **Oziben® 500 mg - comprimé :**

Chez les adultes et les enfants de plus de 5 ans, l'administration répétée de comprimés à 100 mg peut être remplacée par une administration unique d'un comprimé à 500 mg.

La posologie habituelle est de 500 mg en une prise, à renouveler une fois au bout de 3 semaines si l'infestation persiste.

- **Oziben® 200 mg - sachet :**

**Oxyurose :**

1 sachet à renouveler 2 à 4 semaines plus tard. Le premier traitement tue les vers, mais pas les oeufs, ces oeufs pouvant causer une nouvelle infestation, le deuxième traitement est nécessaire pour éliminer complètement l'infestation.

**Ascariidose, trichocéphalose, ankylostomose,**

**infections mixtes :**

1 sachet par jour pendant 3 jours.

**Téniase et anguillulose :**

1 sachet par jour pendant 6 jours.

- **Oziben® 30 ml - suspension buvable**

**Oxyurose :**

5 ml matin et soir dans la même journée, à renouveler 2 à 4 semaines plus tard. Le premier traitement tue les vers, mais pas les oeufs, ces oeufs pouvant causer une nouvelle infestation, le deuxième traitement est nécessaire pour éliminer complètement l'infestation.

**Ascariidose, trichocéphalose, ankylostomose,**

**infections mixtes :**

5 ml matin et soir pendant 3 jours consécutifs, à renouveler 2 à 4 semaines plus tard.

**Téniase et anguillulose :**

5 ml matin et soir pendant 6 jours consécutifs.

## MODE D'EMPLOI ET VOIE D'ADMINISTRATION

- **Oziben® 100 mg - comprimés**

**Oziben® 500 mg - comprimé :**

comprimés à prendre par la bouche avec un liquide.

- **Oziben® 200 mg - sachet :**

sachet à prendre par la bouche, directement ou avec un liquide.

- **Oziben® 30 ml - suspension buvable :**

liquide à prendre par la bouche.

## FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL

### LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Il n'est pas nécessaire de prendre Oziben® avec des aliments: on peut le prendre à jeun. Aucune précaution alimentaire n'est nécessaire et il n'est pas utile de prendre des laxatifs: les vers s'élimineront d'eux-mêmes ou seront digérés.

## CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de prise d'une quantité excessive d'Oziben®, se rappeler d'abord que le produit est très peu absorbé dans l'intestin; consultez votre médecin. Un traitement par le charbon activé est généralement indiqué.

## EFFETS INDÉSIRABLES

Oziben® est généralement bien toléré et peu d'effets indésirables ont été rapportés aux doses prescrites.

Des douleurs abdominales et des diarrhées passagères peuvent survenir, en particulier en cas d'infestation massive.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet indésirable ou gênant qui vous semblerait en rapport avec la prise du produit et qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

## CONSERVATION

- **Oziben® 100 mg - comprimés**

**Oziben® 500 mg - comprimé**

**Oziben® 200 mg - sachet :**

Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

- **Oziben® 30 ml - suspension buvable :**

Conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

## Exploitant :

NYD PHARMA (agréé Swissmedic)

2 place du Port - 1204 Genève - SUISSE

**www.nydpharma.com**

**Fabricant : CIPLA Ltd.**

## Date de révision de la notice :

Janvier 2011.